Неврологические синдромы целиакии

С. В. Копишинская, к. м. н., доцент^{1,2}
С. С. Никитин, д. м. н., проф.³

¹ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Киров; ²АО «Ферст Генетикс», Инновационный центр Сколково, Москва
³Региональная общественная организация «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням», Медицинский центр «Практическая неврология», Москва

С. В. Копишинская

С. С. Никитин

Neurological syndromes of celiac disease

S. V. Kopyshinskaya, S. S. Nikitin

Kirov State Medical University, Kirov; First Genetics Laboratory, Skolkovo Innovation Centre, Association of Neuromuscular Disorders Specialists, Medical Centre 'Practical Neurology'; Moscow; Russia

Резюме

Целиакия – это аутоиммунное заболевание у людей с генетической предрасположенностью, возникающее вследствие потребления белков глютена пшеницы, ржи, ячменя и характеризующееся воспалением слизистой тонкой кишки и атрофией ворсинок. Полиневропатия, мигрень, хроническая мозжечковая атаксия и фибромиалгия – это самые частые экстраинтестинальные синдромы целиакии. Исследование тонких нервных волокон необходимо при таких болезненных синдромах целиакии, как глютенная полиневропатия и фибромиалгия, а также при глютенной вегетативной полиневропатии. Исследование антинейрональных антиганглиозидных антител необходимо при таких поражениях центральной и периферической нервной системы, как глютенная полиневропатия и глютенная мозжечковая атаксия. Аглютенная диета напрямую влияет на исчезновение приступов головной боли или на уменьшение их частоты и интенсивности. Имеется мало исследований по влиянию аглютенной диеты на риск развития головной боли.

Ключевые слова: целиакия, атаксия, мигрень, полиневропатия, полиневропатия тонких волокон, фибромиалгия, антинейрональные антиганглиозидные антитела, глютен.

Summary

Celiac disease is an autoimmune disease in people with a genetic predisposition resulting from the consumption of gluten proteins from wheat, rye, barley and characterized by inflammation of the mucous membrane of the small intestine and atrophy of the villi. Neuropathy, migraine, chronic cerebellar ataxia and fibromyalgia are the most common extraintestinal celiac disease syndromes. The study of small nerve fibers is necessary for painful celiac disease syndromes such as gluten neuropathy and fibromyalgia, as well as for gluten autonomic neuropathy. The study of antineuronal antiganglioside antibodies is necessary for such lesions of both the central and peripheral nervous systems as gluten neuropathy and gluten cerebellar ataxia. A gluten-free diet directly affects the disappearance of headache attacks or a decrease in their frequency and intensity. There is little research on the effect of a gluten-free diet on headache risk.

Key words: celiac disease, ataxia, migraine, neuropathy, small fiber neuropathy, fibromyalgia, antineuronal antiganglioside antibodies, gluten.

Целиакия – это аутоиммунное заболевание у людей с генетической предрасположенностью, возникающее вследствие потребления белков глютена пшеницы, ржи, ячменя [1, 2]. Целиакия характеризуется воспалением слизистой тонкой кишки и атрофией ворсинок вследствие потребления глютена, что нивелируется при исключении глютена из диеты. Ранее считалось, что это редкий синдром мальабсорбции у детей [3, 4]. На данный момент известно, что целиакия – это состояние с мультиорганным поражением, которое может быть диагностировано в любом возрасте [5, 6, 7]. Целиакия широко распространена в общей популяции, около 1% [8, 9, 10]. За последние 40 лет появились исследования об ассоциации целиакии и неврологических заболеваний [11, 12]. Известно, что невро-

логические проявления встречаются у 10–22% пациентов с целиакией, по данным разных авторов [13, 14]. В одном исследовании говорится, что 7% пациентов с целиакией дебютируют неврологическими синдромами [15, 16].

Глютенная полиневропатия

Считалось, что целиакия чаще осложняется поражением центральной нервной системы, а не периферической [17, 18, 19, 20]. Полиневропатия может быть до, во время и после манифестации гастроинтестинальных проявлений [21, 22]. Однако в последнее время появилась информация о вероятности частой распространенности полиневропатии тонких волокон при целиакии. Общий фенотип глютенной полиневропатии – это медленно прогрессирующая, обычно немного асимметричная,

дистальная болезненная полиневропатия тонких волокон, манифестирующая на шестой декаде, иногда протекающая с клиническими или субклиническими вегетативными проявлениями [13, 23, 24]. Это полиневропатия, избирательно поражающая миелиновые и безмиелиновые нервные волокна малого диаметра. Чаще всего такую полиневропатию, вызывающую вегетативные расстройства и болевой синдром, считали идиопатической [25, 26]. Известно, что более 50% полиневропатии тонких волокон до последнего времени остается идиопатической, то есть этиология остается неизвестной [27]. Фархад и др. в крупном исследовании на 284 пациентах с идиопатической полиневропатией выявили 1,4% пациентов с целиакией. Почти все эти четверо больных были с полиневропатией тонких волокон [28].

Имеются данные, что 5% пациентов с целиакией были выявлены в течение года среди группы пациентов с идиопатической полиневропатией тонких волокон [21]. Процент идиопатической полиневропатии среди полиневропатии толстых волокон меньше, 23–24% [28, 29]. Электронейромиография не информативна в диагностике полиневропатии тонких волокон. Необходимо развитие новых методов диагностики полиневропатии тонких волокон, так как глютенная полиневропатия может быть очень распространена. Самым объективным методом диагностики С-волокон полиневропатии является иммуногистохимическое исследование С-волокон в кожном биоптате [30–32]. Описаны случаи поражения аксонов толстых сенсорных волокон при целиакии. Также описана инфильтрация воспалительными клетками спинномозговых корешков у пациента с целиакией и полиневропатией [33]. В популяционном исследовании пациентов с сахарным диабетом первого типа доказано, что целиакия, как сопутствующая патология, не отягощает тяжесть клиники полиневропатии [34, 35]. Имеется крупное исследование по глютенной полиневропатии, где показаны ее аксональный тип, поражение как моторных, так и сенсорных волокон, а также повышенный порог на тепловые болевые раздражители и прикосновение. Важным из этого исследования был вывод, что строгая аглутеновая диета имела положительное действие на жалобы и клинику пациентов с глютенной полиневропатией, однако сохранялся большой процент пациентов с клинической и субклинической полиневропатией, несмотря на аглутеновую диету [36, 37, 38]. Необходимо проведение более крупного исследования для оценки эффективности аглутеновой диеты.

Подобные противоречивые результаты наблюдаются у больных с целиакией на фоне соблюдения аглутеновой диеты и с антинейрональными антителами [39, 40, 41]. Известно, что их распространенность у взрослых от 22 до 61%, в то время как у детей – 5%. Опи-

сано, что антинейрональные антиганглиозидные антитела не исчезают у взрослых пациентов после соблюдения строгой аглутеновой диеты, однако описан случай их исчезновения у ребенка [42]. Вольта и др. описали исчезновение антител в течение года у большинства пациентов, а также регрессию этих антител у детей с целиакией на фоне аглутеновой диеты [43]. Выдвинута гипотеза, что чувствительность к глютену неврологических синдромов, а также возможность их регрессии на фоне аглутеновой диеты есть первый этап неврологических синдромов целиакии. Необходимо информировать неврологов о глютенных неврологических синдромах, чтобы диагностировать эту патологию и назначать диету как можно раньше. Необходимо создание российских методических рекомендаций по диагностике и ведению подобных пациентов в неврологической практике. Следующий этап развития глютенных неврологических синдромов может оказаться глютен-нечувствительным. Здесь уже клиника не будет зависеть от соблюдения аглутеновой диеты [44]. Титр антинейрональных антиганглиозидных антител будет сохраняться и, возможно, поддерживать хронизацию этих синдромов, в частности глютенной полиневропатии. Отмечено, что высокий средний возраст пациентов с глютенной полиневропатией объясняет риск развития аутоиммунных реакций при длительном воздействии глютена на периферическую нервную систему [45].

Поражение периферической нервной системы у детей с целиакией встречается редко [46, 47, 48]. Описан случай выявления сенсорно-моторной демиелинизирующей полиневропатии у девочки 15 лет, нивелирующейся на фоне строгой безглютенной диеты [49]. Известно о случае мультифокальной мононевропатии у ребенка без положительного эффекта аглутеновой диеты [50]. Есть также описание двух случаев прогрессирующей аксональной полиневропатии без улучшения на фоне аглутеновой диеты у детей. Также известно о выявлении двух пациен-

тов с аксональной полиневропатией среди 27 детей с целиакией. Известно о девочке с целиакией и острой демиелинизирующей полиневропатией без положительных антител. Однако произошло быстрое исчезновение клиники полиневропатии на фоне аглутеновой диеты. Имеется два описания синдрома Гийена-Барре у детей с целиакией. Примечательно, что в обоих случаях клиника нивелировалась на фоне аглутеновой диеты в течение нескольких месяцев. Также показательно, что оба случая целиакии были диагностированы только при диагностике этой острой воспалительной демиелинизирующей полиневропатии [51, 52]. Необходимо помнить о возможности глютенной острой полиневропатии у детей, которая может исчезнуть на аглутеновой диете [33]. Это еще раз подтверждает необходимость как можно ранней диагностики глютенной неврологической патологии для избегания серьезных и необратимых повреждений периферической и центральной нервной системы при воздействии глютена [53, 54].

Точная причина полиневропатии при целиакии не известна, однако существует три гипотезы. К этим гипотезам относятся действие антител к экстраинтестинальной тканевой трансглутаминазе [55, 56, 57], патогенное вовлечение антиганглиозидных антител [58, 59], прямое токсическое действие глиадина [60] и дефицит витаминов В₆, В₁₂ и Е [61, 62]. Однако не всегда обнаруживается дефицит витаминов у пациентов с полиневропатией и целиакией. В одном исследовании из 18 пациентов с полиневропатией и биопсия-верифицированной целиакией все 18 пациентов имели нормальный уровень витамина В₁₂ и меди или легкую гиперкупремию [63, 64]. В другом исследовании все 20 пациентов с полиневропатией и целиакией имели нормальный уровень витамина В₁₂ и 16 пациентов, которые были протестированы, имели нормальные уровни витаминов В₁, В₆ и Е [65, 66]. Имеется информация, что у пациентов с биопсия-верифицированной целиакией в несколько раз чаще выявляются положитель-

ные антитела к деамидированным пептидам IgA и IgG, тканевой трансглутаминазе IgA, антиэндомизимальным антителам IgA по сравнению с группой контроля без энтеропатии [67]. Интересной попыткой изучить патогенез вегетативной полиневропатии у 34 пациентов с целиакией по сравнению с группой контроля в 34 человека без целиакии. Были обнаружены высокие уровни антител GM1, интерлейкина-10 и их корреляции с данными вариабельности ритма сердца у пациентов с целиакией [68]. Было также выявлено, что активация симпатической нервной системы индуцирует выброс интерлейкина-10, при этом блокирование парасимпатической нервной системы усиливает воспаление в кишечнике. У пациентов с целиакией преобладает симпатическая нервная система [68, 69]. Описаны нарушения перистальтики желудочно-кишечного тракта, сопровождающие целиакию, но патомеханизмы, вызывающие нарушения, полностью не изучены [70, 71]. Одна из гипотез включает патологию вегетативной нервной системы. Корреляции между изменениями миоэлектрической активности желудка и наличием антиганглиозидных антител и интерлейкина-10 до сих пор не изучены [72].

Ответ целиакия-ассоциированной полиневропатии на аглютенную диету противоречивый [73]. Одни авторы подтверждают положительный эффект диеты на электронейромиографические данные, другие сообщают об отсутствии эффекта от аглютенной диеты [74]. Как сказано выше, Луостаринен и др., по данным своего крупного исследования 32 пациентов с глютенной полиневропатией, и Бриани и др., на основании четырех наблюдений, сообщили об отсутствии положительного действия диеты [38, 42, 75]. Вольта и др. описали семь случаев улучшения и даже полного исчезновения клиники полиневропатии на фоне аглютенной диеты [43].

Известно, что в общей популяции распространенность полиневропатии составляет от 2 до 7% [76]. Основным подтипом является дис-

симальная симметричная полиневропатия. Согласно одному из исследований, в США в 2012 году выявлено 39% пациентов с симптомами полиневропатии среди 401 пациента с подтвержденной биопсией целиакией [77]. До этого в 2003 году финские исследователи обнаружили полиневропатию у 23% пациентов с целиакией посредством электронейромиографии [38]. Первое популяционное исследование было проведено в Швеции, где среди 14 тысяч пациентов с подтвержденной биопсией целиакией было выявлено случаи поздней полиневропатии в три раза больше, чем в группе контроля без целиакии [78]. Однако данное исследование было ограничено только амбулаторными больными, поэтому риск полиневропатии, возможно, был переоценен. Следующим крупным шведским популяционным исследованием с целью изучения риска развития полиневропатии у 28 232 пациентов с подтвержденной биопсией целиакией было исследование Тавани и др. [79]. Группа контроля без целиакии составляла 139 473 человек. Был выявлен 2,5-кратный риск развития поздней полиневропатии у пациентов с целиакией. Также отмечен повышенный риск развития хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии, вегетативной полиневропатии и мультифокальной мононевропатии [80]. Повышенного риска развития острой воспалительной демиелинизирующей полиневропатии обнаружено не было. Необходимо ввести скрининг всех полиневропатий на целиакию. Также в скрининг пациентов с биопсия-верифицированной целиакией на полиневропатию тонких волокон необходимо ввести биопсию кожи с подсчетом C-волокон. Имеется вероятность, что процент пациентов с поражением периферической нервной системы будет в несколько раз выше. В нашей клинике впервые в стране проводится подсчет C-волокон с помощью гистохимического исследования биоптата кожи. Также необходимо, кроме опросника на полиневропатию, при скрининге ввести электронейрофизиологическое обследование пациентов с це-

лиакией. Оба инструментальных метода необходимо использовать в диагностике глютенной полиневропатии, так как это курабельное состояние, если скрининг и инициация аглютенной диеты проводятся в более раннем возрасте.

Глютенная атакия

Глютенная атакия (ГА) – это аутоиммунное аутосомно-рецессивное заболевание, которое возникает в результате употребления глютена у генетически предрасположенных людей [81]. ГА является наиболее распространенной мозжечковой атакией среди пациентов с предположительной идиопатической спорадической атакией. Нервная система может быть единственным органом-мишенью этого аутоиммунного заболевания, возникающего при употреблении глютена. Доказательством иммунологической природы заболевания служат реактивность между антителами и клетками Пуркинье, воспалительные явления в ткани мозжечка, более высокий риск других аутоиммунных заболеваний у пациентов с ГА. Более того, имеются сообщения о клинической эффективности строгой аглютенной диеты и внутривенных иммуноглобулинов в лечении ГА.

Целиакия часто встречается при различных неврологических заболеваниях неясной этиологии. Раньше причиной атаксии при целиакии считалась мальабсорбция нейропротективных или нейротрофических питательных веществ, например витамина E [82], однако в последних исследованиях ГА никто из пациентов не имел гиповитаминозов или мальабсорбцию [83]. У генетически предрасположенных людей потребляемый глютен приводит к активации иммунореактивных эпителиев, что инициирует мальадаптивный иммунный ответ. У пациентов с диагнозом «целиакия», подтвержденным данными биопсии тонкой кишки, антитела класса A (IgA) к глиадину (antigliadin antibodies, AGA) имеют чувствительность 81–83% и специфичность 82–89% в диагностике заболевания, в то время как чувствительность AGA класса G – 82–99%

и специфичность – 76–92%. В связи с тем, что ГА – одна из наиболее распространенных причин идиопатической спорадической атаксии, тест на АГА ранее был рекомендован к проведению всем пациентам со спорадической атаксией [84]. По данным некоторых прошлых исследований, АГА обнаруживались у пациентов со спорадическими атаксиями в 12–68% случаев [9]. К сожалению, позже было выявлено, что эта ассоциация оказалась слабой. Многие из исследований проводились на небольших популяциях пациентов со спорадической атаксией, другие исследования не подтвердили этой ассоциации, так как, несмотря на выявление АГА у 19% пациентов со спорадической атаксией, не было обнаружено статистически значимой разницы с распространенностью АГА в контрольной популяции.

Также активно обсуждался возможный нейротоксический потенциал АГА. Было установлено, что распространенность АГА составляет 8% в группе контроля, 19% в группе больных спорадической атаксией, 8% в группе больных с рецессивными атаксиями, 15% в группе доминантных атаксий. Статистически значимой разницы в этих группах выявлено не было. С другой стороны, Хадживасилиу и соавт. сообщили о распространенности АГА в 32–41% в группе пациентов со спорадической атаксией и только 14% в группе наследственных атаксий, показав статистически значимую разницу в этих группах, однако наследственные атаксии не делились по молекулярному признаку [61]. В то же время была выявлена высокая (44%) распространенность АГА среди пациентов с болезнью Гентингтона, что было значительно выше, чем в популяции США.

Нейротоксичность АГА обусловлена возможностью доступа антител к структурам центральной нервной системы (ЦНС). АГА обнаружены в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) пациентов с целиакией и патологией нервной системы. У пациентов с ГА обнаружена лимфоцитарная инфильтрация периваскулярного пространства и нейропилей CD4 и CD8 Т-клетками, вследствие чего

нарушается гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), и АГА получают доступ в ЦНС [85]. В норме IgG проходят ГЭБ и проникают из сыворотки крови в ЦСЖ в 1/500 доле путем пассивной фильтрации. Более высокая концентрация антител в сыворотке приводит к более высокому уровню антител в ЦСЖ. Теория о локальной продукции антител к глиадину в ЦСЖ не подтверждается тем, что в одном из исследований не было обнаружено АГА у 12 пациентов с ГА [86]. Обнаружена ассоциация между уровнем АГА в сыворотке и спиноцеребеллярной атаксией (СЦА) второго типа, в связи с чем представляет интерес изучение роли аглютенной диеты как модификатора СЦА второго типа. Эти находки позволяют говорить о возможном механизме развития наследственной атаксии и других нейродегенеративных процессов, в котором основным звеном является продукция антител к глютену. Распространенность АГА в здоровой популяции варьирует от 5 до 12% и зависит от типа теста на АГА и распространенности целиакии в той или иной стране.

Распространенность целиакии в большинстве европейских стран составляет как минимум 1% [87]. Географические вариации распространенности целиакии также могут влиять на встречаемость АГА у пациентов со спорадической атаксией в разных странах. Существует мнение, что АГА не могут быть использованы как маркер глютенной атаксии ввиду их высокой распространенности в здоровой популяции, однако то же самое можно сказать и о ревматоидном факторе при диагностике ревматоидного артрита [88]. В отсутствие более специфичных маркеров АГА остаются самым чувствительным тестом в диагностике ГА в группе идиопатических спорадических атаксий.

По данным работы Лока и соавт., включавшей 7 пациентов с наследственными атаксиями, 20 больных идиопатическими атаксиями и 32 пациента с ПНП, ни в одной из трех групп не было выявлено ни одного случая целиакии [89]. Ни у кого не было положительного результата

на IgA-антитела к тТГ, которые также являются чувствительным маркером ГА. Это отличается от результатов других работ, сообщающих о 12,5–28,0% целиакии при идиопатической атаксии [90]. Профессор Лок не согласен, что серопозитивность по АГА является синонимом целиакии как в группе пациентов с неврологическими заболеваниями, так и в других группах. По данным его исследования, в группах пациентов с наследственными атаксиями, идиопатическими атаксиями и ПНП АГА в среднем составляли 40%, а в группе здоровой популяции – 10–15%. Даже в случае целиакии АГА не являются специфичными, и уже довольно давно используются антитела класса А к тканевой трансглутаминазе (тТГ) и антитела к эндомизину. Аналогичная ситуация наблюдается у людей без аллергических симптомов и с IgE-антителами: со временем эти антитела исчезают из крови [91].

Комбаррос с соавт. обследовал 32 пациента с идиопатической мозжечковой атаксией из Северной Испании на IgA и IgG к глиадину, IgG-, IgA-, IgM-антитела к ретикулину и эндомизину и IgG- и IgA-антитела к тТГ. Ни у одного из пациентов эти антитела не были обнаружены, что говорит в этом исследовании об отсутствии связи между целиакией и идиопатической мозжечковой атаксией [92].

Имеется много доказательств, что поражение нервной системы при целиакии имеет иммунную природу. Морфологические исследования мозжечка у пациентов с ГА выявили потерю клеток Пуркиньи в виде пятен по всей площади коры мозжечка, в белом веществе мозжечка были обнаружены астроцитарный глиоз, вакуолизация нейропилей и диффузные клеточные инфильтраты, состоящие в основном из Т-лимфоцитов. Также обнаружено скопление Т-лимфоцитов вокруг кровеносных сосудов с небольшим количеством В-лимфоцитов и макрофагов в белом веществе мозжечка и задних столбах спинного мозга, в периферической нервной системе отмечаются редкие лимфоцитарные инфильтраты [93]. Таким образом, основными патоморфологическими признаками ГА являются

потеря клеток Пуркинье и (или) дегенерация задних столбов спинного мозга с лимфоцитарной инфильтрацией мозжечка, задних столбов спинного мозга и периферических нервов [94].

В эксперименте доказано перекрестное образование антител к антигенным эпитомам клеток Пуркинье и пептидов глютена. Сыворотка пациентов с ГА демонстрирует кросс-реактивность с эпитопами клеток Пуркинье как мозжечка человека, так и мозжечка крысы [95, 96, 97, 98]. Этими находками можно объяснить, почему у некоторых пациентов с наследственными дегенеративными атаксиями обнаруживаются антитела к глиадину: антитела к белкам дегенерирующих клеток Пуркинье (как к эпифеномену) перекрестно связываются с пептидами глиадина, и затем начинается генерация антиглиадиновых антител. У пациентов с ГА было обнаружено отложение антител к тТГ вокруг сосудов головного и спинного мозга большей частью в мозжечке, стволе и спинном мозге. Также были найдены антитела к тТГ⁶, широко распространенной в головном мозге [99]. В исследовании на мышцах было показано возникновение атаксии после интравентрикулярной инъекции как сыворотки больных с ГА, так и моноклональных анти-тТГ иммуноглобулинов, полученных при помощи фагов. Эти данные доказали, что именно полученные от пациентов с ГА анти-тТГ иммуноглобулины нарушают функцию нейронов в определенных участках головного мозга. Имеются данные, что в сыворотке пациентов с ГА имеются и другие антитела к эпитомам клеток Пуркинье, так как даже после удаления из сыворотки антител к глиадину продолжают иммунологические реакции с клетками Пуркинье. Обнаружение этих дополнительных антител позволит выявить более специфичный маркер ГА.

Известно, что целиакия возникает в результате взаимоотношений генетических и средовых риск-факторов, таких как HLA-DQ2/8 гаплотипы, аутоантигены, ферментно-тканевая трансглутаминаза и их субстрата глиадина. Деамидация глиадина

вызывает формирование HLA-DQ гетеродимеров, работающих как антиген-представляющие молекулы. Интересно, что повреждение кишки связано с оральной дозой глиадина [67], однако большинство пациентов с ГА не имеют тяжелой кишечной патологии: отмечается легкое поражение тонкой кишки, несмотря на потерю веса и хроническую диарею. В последнее время стало известно, что при ГА гуморальные иммунные механизмы базируются на наличии антинейрональных антител (IgG- и IgA-антитела к трансглутаминазе 6) против нейронов мозжечка. Однако эти антитела могут выявляться и у пациентов без неврологической патологии. Также в периваскулярном пространстве в мозжечке и стволе мозга у пациентов с ГА была обнаружена колокализация IgA и тканевой трансглутаминазы. Этот феномен указывает на наличие специфических IgA-антител к тканевой трансглутаминазе при ГА [9, 96]. Другие исследователи не смогли найти каких-либо антител против нейрональной ткани у пациентов с ГА [100].

Недавно было продемонстрировано, что циркумвентрикулярные органы могут быть входными воротами для активированных иммунных клеток в ЦНС [101]. Возможно, нейрональное повреждение обусловлено специфической мимикрией между антигенами, обнаруженными как в кишке, так и в специфических клетках ЦНС, либо повреждение структур ЦНС является результатом специфической локализации по соседству с циркумвентрикулярными органами.

В последних работах авторы предположили возможность обнаружения антител к тТГ даже в случаях неизменной слизистой двенадцатиперстной кишки. На основании этого были взяты биоптаты у девяти пациентов с ГА со слизистой тощей кишки и у семи с другими видами атаксии. Эти биоптаты были проверены на наличие депозитов тТГ-обусловленных иммуноглобулинов с использованием двойной цветной иммунофлюоресценции. Также была изучена ткань мозга пациента с ГА и пациента без неврологической симптоматики.

Депозиты IgA-антител к тТГ были обнаружены в ткани тощей кишки у всех пациентов с ГА и ни у одного из группы контроля. Распространенные IgA-депозиты вокруг сосудов были обнаружены в мозге пациента с ГА и отсутствовали в мозге у пациента без неврологической симптоматики. Эти депозиты не были резко выраженными в мозжечке, стволе и спинном мозге [97]. Эта работа показала, что IgA-антитела к тТГ находятся в кишечнике и в мозге пациентов с ГА с или без энтеропатии и отсутствуют у пациентов с другими видами атаксии.

Перечисленные находки подтверждают, что ГА является иммунным заболеванием. Также имеются предположения, что тТГ играет ведущую роль в патогенезе неврологических синдромов при ГА. Идентификация специфической мозговой тТГ может дать нам более специфический маркер ГА.

ГА не имеет каких-либо особых признаков, которые помогли бы отличить ее от спорадической атаксии, а также от пациентов с целиакией и с атаксией. ГА характеризуется незаметным началом, преимущественно с нарушения походки. Примечательно, что данная медленно развивающаяся атактическая походка сопровождается появлением симптомов ПНП. ГА обычно начинается незаметно, средний возраст дебюта болезни – 53 года, гендерных различий нет. ГА редко имеет быстро прогрессирующее течение, схожее с паранеопластической мозжечковой дегенерацией [83]. Чаше атаксия более выражена в нижних конечностях, чем в верхних. Установочный нистагм и другие глазодвигательные симптомы мозжечковой дисфункции выявляются более чем в 80% случаев [95]. Однако эти симптомы наблюдаются редко. Более 60% пациентов имеют сенсорно-моторную аксональную ПНП, по данным электронейромиографии. Обычно эти проявления весьма легкие и не способствуют развитию атаксии. По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга, более 60% пациентов с ГА имеют признаки атрофии мозжечка, в случае отсутствия атрофии выявляется иная патология мозжечка [102].

ГА часто сочетается с другими аутоиммунными заболеваниями, среди которых наиболее часто встречаются гипотиреоз (у пациентов с ГА часто выявляются тиреоидные АТ даже при эутиреозе), сахарный диабет первого типа, пернициозная анемия. Дефицит витамина Е выявляется редко. Желудочно-кишечные симптомы также редки и не являются индикатором наличия или отсутствия энтеропатии. Выявленная при биопсии двенадцатиперстной кишки энтеропатия встречается только у трети пациентов с ГА. При ГА часто обнаруживаются антитела к глиадину, эндомизию, тТГ, а также HLA типа DQ2 [103, 104].

С. Кюрри с соавт. обнаружили неврологические симптомы у 11 из 30 вновь выявленных больных с целиакией: 10 пациентов с легкой атаксией при ходьбе и один больной с ПНП. Также в группе из 20 пациентов с целиакией, первыми симптомами которой были неврологические, выявлено 16 (80%) больных с атаксией при ходьбе и 4 (20%) больных с сенсорной ПНП. В этой группе больных, по данным протонной МР-спектроскопии, выявлено отчетливое снижение N-ацетиласпартата к креатину по сравнению с группой больных с вновь выявленной целиакией и группой здоровых добровольцев. По данным МРТ головного мозга, у пациентов из группы целиакии с дебютом в виде неврологической симптоматики выявлены множественные регионы сниженной плотности серого вещества головного мозга, особенно в мозжечке, а также в супратенториальной области. У пациентов с вновь выявленной целиакией отмечалось лишь умеренное снижение серого вещества в цингулярной извилине [105].

В одном из исследований 42 пациентам с целиакией было проведено неврологическое обследование [106]. Ни у кого из пациентов не было жалоб на нарушение координации, походки. При клиническом обследовании у 8 (19%) пациентов выявлены симптомы мозжечкового дефицита: у одного – пальценосовая проба с мимопопаданием, у пяти – установочный нистагм, и у двоих па-

циентов был позиционный нистагм при взгляде в стороны. По данным электронистагмографии, в группе пациентов с целиакией чаще выявляются дисметрия (26,2%) и гиперметрия саккад, чем в группе контроля. Дисметрия саккад, часто сочетающаяся с гиперметрией, является симптомом дисфункции ядра шатра (*nucleus fastigii*). Возникновение субклинических мозжечковых симптомов не зависело от возраста пациента, длительности болезни, комплайенса к диете и не ассоциировалось с наличием антинейрональных антител в сыворотке крови.

Более чем у 60% пациентов с ГА выявляется атрофия мозжечка на МРТ. У некоторых больных обнаруживается патология белого вещества, часто обширная, со сливными очагами. Данные очаги также описаны у пациентов с синдромом мигрени с аурой как в сочетании, так и без ГА [96]. Может быть выявлена патология мозжечка, по данным протонной МР-спектроскопии. В исследованиях метаболического статуса мозжечка при помощи протонной МР-спектроскопии была выявлена отчетливая разница среднего уровня N-ацетиласпартата на коротком эхо-времени и соотношения N-ацетиласпартат/холин на длинном эхо-времени между 15 пациентами с ГА и 10 из группы контроля [100].

Ответ на лечение аглютеновой диетой зависит от продолжительности течения атаксии до постановки диагноза целиакии [107]. Конечный результат пролонгированной экспозиции глютена у пациентов с ГА – необратимая потеря клеток Пуркинью в мозжечке. Быстрое назначение диеты может привести к улучшению или стабилизации атаксии. Стабилизация или даже улучшение течения атаксии обычно возникает через год применения строгой аглютеновой диеты. Во время диеты рекомендуется регулярно выполнять анализ на антитела к тТГ, чтобы контролировать элиминацию этих антител [108].

Было опубликовано только одно систематическое исследование эффекта аглютеновой диеты на когорту пациентов с неврологической симптоматикой с энтеропатией или без нее [13].

В исследовании принимали участие 43 пациента с ГА, на строгой аглютеновой диете с последующей элиминацией антиглиадиновых антител было 36 пациентов. Они составляли группу лечения. Группу сравнения составляли 40 пациентов, которые не соблюдали диету. В начале исследования между двумя группами не было большой разницы по результатам тестов на атаксию. Достоверное улучшение было по всем тестам, а также по субъективной глобальной шкале клинического улучшения в группе лечения по сравнению с группой сравнения. Отчетливое улучшение по тестам на атаксию сохранилось даже после исключения из групп пациентов с энтеропатией. Данное исследование показало, что аглютеновая диета является эффективным лечением ГА [109].

Лечение ГА иммуносупрессантами и внутривенными иммуноглобулинами должно быть рассмотрено при неэффективности строгой аглютеновой диеты (с элиминацией антител), соблюдаемой более года, либо в случае быстро прогрессирующего течения атаксии [121]. Если пациент соблюдает строгую аглютеновую диету, но анализ крови по-прежнему показывает положительные антитела к тТГ, необходимо еще раз пересмотреть диету, прежде чем перейти к иммуносупрессивному лечению. Дело в том, что даже небольшого количества глютена достаточно для того, чтобы поддерживался иммунный процесс, приводящий к повреждению нервной ткани [110].

Иммуносупрессивная терапия, состоящая из внутривенного введения иммуноглобулинов, циклоспорина, циклофосфамида, микофенолата, назначается и в случаях резистентных неврологических синдромов [110]. Однако эти случаи редки, и в большинстве своем плохой ответ на аглютеновую диету обусловлен ее нарушением. Назначение диеты пациентам с атрофией мозжечка по МРТ приводит к стабилизации процесса и небольшому улучшению атаксии.

Глютенная мигрень

Несмотря на то что полиневропатия и атаксия описываются как самые частые неврологические

экстраинтестинальные синдромы целиакии, появляется много статей о головной боли как о частом проявлении целиакии [112, 113]. И все же на данный момент имеется мало работ о распространенности головной боли среди пациентов с целиакией. В исследовании Цельника и др. выявлено 14 пациентов с мигренью из 111 пациентов с целиакией (12,6%). Распространенность мигрени в контроле была намного ниже, только у 12 (5,7%) из 211 человек [114]. В исследовании Димитровой мигрень была выявлена у 40 (21%) из 188 пациентов с целиакией по сравнению с 13 (7%) из 178 человек из группы контроля [115]. В педиатрическом исследовании среди 72 пациентов с мигренью обнаружено 4 (5,5%) случая повышенных антител к трансглутаминазе IgA, что является надежным показателем наличия целиакии. Повышенные антитела к трансглутаминазе IgA были обнаружены только у 1 (0,6%) из 147 детей из группы контроля [116]. Известно об исследовании Цикарелли и др. о 32%-ной распространенности мигрени среди 176 пациентов с целиакией. Бриани и др. обнаружили только 5,6% у 71 пациента. В США среди 188 пациентов с целиакией у 30 % выявлена распространенность хронической головной боли. Также в США в 2016 году проведено 10-летнее популяционное обсервационное исследование более 28 тысяч пациентов с целиакией, показавшее высокий риск развития головной боли. В этой работе были еще две интересные особенности – риск развития головной боли исследовали не только у пациентов с верифицированной целиакией, а также и у пациентов без целиакии, но (1) с воспалением слизистой тонкой кишки, и (2) с неповрежденной слизистой, но с положительными антителами на целиакию. При этих двух состояниях также был отмечен повышенный риск развития головной боли. Среди всех видов головной боли у пациентов с целиакией чаще встречалась мигрень. Мигрень была одинаково распространена у лиц обоего пола. Это исследование показало высокий риск постановки диагноза

целиакии у пациентов, пришедших в клинику с мигренозными атаками. Слабым местом этого исследования было малое количество лиц пожилого и старческого возраста. Предположительно, наибольшее количество мигреноподобных атак у лиц с целиакией должно быть именно у них. Также отмечено, что в течение 10 лет наблюдений за пациентами с целиакией имеется выявление головной боли. То есть чем больше стаж целиакии, тем больше вероятность иметь головную боль [117].

Согласно исследованию патогенеза глютенной мигрени, выдвигается гипотеза о том, что интерферон-гамма (IFN- γ) и фактор некроза опухоли альфа (TNF- α) участвуют в развитии и прогрессировании мигрени у пациентов с целиакией [118]. Есть предположение, что TNF- α определяет восприимчивость к мигрени путем увеличения количества кальцитонин ген-связанного пептида (CGRP) через активацию путей митоген-активированного пептида киназы (MAPK). В свою очередь, IFN- γ вызывает мигренозную атаку посредством активации фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K). Таким образом, пациенты, страдающие мигренью, должны быть скринированы на целиакию, а также им должна быть предложена безглютеновая диета. Двойной таргетинг MAPK/PI3K может быть эффективной стратегией против целиакии. Необходимы дальнейшие исследования для изучения синергического ингибирования MAPK/PI3K. Это может обеспечить новые взгляды на молекулярные механизмы целиакии и возможности ее лечения [119, 120].

Другим потенциальным механизмом развития головной боли при целиакии является церебральная гипоперфузия, которая чаще встречается при нелеченной целиакии. У пациентов с антиглиадиновыми антителами как с целиакией, так и без нее, на МРТ чаще выявляются мигрень и лейкоароз, то есть поражение белого вещества головного мозга, [121, 122].

Серотонинергическая система выполняет ингибирующую функцию в головном мозге и играет ключевую

роль в патогенезе мигрени. При мигрени изменяется уровень серотонина в крови: в межприступном периоде он ниже, а во время приступа – выше, чем у здоровых лиц. Во время приступа снижается концентрация серотонина в тромбоцитах. При мигрени ускоряется распад серотонина. В связи с этим является перспективно изучение заболеваний с нарушением метаболизма серотонина [123]. Одним из таких заболеваний является целиакия.

Наиболее современной гипотезой патогенеза мигрени при целиакии является влияние микробиоты кишечника на функционирование головного мозга [124]. Во время беременности клетки головного мозга и кишечника развиваются почти одновременно в центральную нервную систему и нервную систему кишечника соответственно. Они остаются связанными через блуждающий нерв пожизненно. Хотя хорошо известно, что мозг посылает сигнал в кишечник, сообщение фактически двунаправленно. Так же, как мозг может модулировать функционирование кишечника, кишечник и, вероятно, то, что мы едим, могут фактически влиять на функционирование нашего мозга. В настоящий момент обсуждается влияние микробиоты кишечника на функционирование мозга и то, как работа кишечника и диета могут влиять на мигрень [125, 126].

Недавние исследования показывают, что мигрень может быть связана с желудочно-кишечной патологией, включая синдром раздраженной толстой кишки, язвенный колит и целиакию. Имеется более высокая распространенность головных болей у пациентов с такими диагнозами. Дети от матерей с мигренью чаще имеют инфантильную колику. А также дети с мигренью чаще жалуются на инфантильную колику по сравнению с контролем. Возможными механизмами мигрени и целиакии могут быть повышенная проницаемость кишечника и воспаление. Поэтому было бы целесообразно дополнительно исследовать эти механизмы у пациентов с мигренью. Эти механизмы также дают обоснование для изучения влияния использования пре- и пробиотиков у пациентов

с мигренью. Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека [127]. Одним из возможных механизмов пробиотиков в лечении целиакии является усиление проницаемости кишечного барьера. *In vitro*, а также *in vivo* было доказано улучшение барьерной функции эпителия при лечении пробиотиками [128, 129]. Также имеются исследования по положительному действию пробиотиков на клеточной культуре или животных моделях [130]. В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании у здоровых взрослых пробиотики смогли улучшить эпителиальный барьер путем изменения местоположения плотных соединений белков в эпителиальном слое [131]. Поскольку пробиотики могут играть роль в поддержании или улучшении барьерной функции кишечника у людей, они могут иметь благоприятный эффект у пациентов с мигренью с повышенной кишечной проницаемостью [132]. До сих пор нет клинического рандомизированного контролируемого исследования, где пациенты с мигренью получали нутритивную терапию с пробиотиками. В неконтролируемом исследовании сообщается о сочетании различных пробиотиков (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, *Enterococcus faecium* и *Bifidobacterium bifidum*) с витаминами, минералами, микроэлементами и травами в терапии 40 пациентов с мигренью. Было показано улучшение показателей качества жизни в два раза после 90 дней лечения вышеуказанными препаратами. О прекращении мигренозных атак сообщили 60% пациентов с мигренью [133].

Имеется мало исследований по влиянию аглютенной диеты на риск развития головной боли [134]. Цикарелли и др., проведя анкетирование 140 пациентов с целиакией, обнаружили положительную динамику снижения развития приступа головной боли [81]. Также было обнаружено, что 6-месячная аглютенная диета либо избавляет от мигренозных атак, либо снижает их частоту, продолжительность и интенсивность [44].

Глютенная фибромиалгия

Фибромиалгия (ФМ) – это комплексный хронический болевой синдром, поражающий около 2% мировой популяции, в основном женщин, и характеризующийся широко распространенной болью в мягких тканях, генерализованными чувствительными точками, патологической усталостью и нарушением сна [135]. Распространенность ФМ в разных странах составляет от 2% в США и Франции до 4% в Испании [107]. ФМ характерна для всех возрастов, этнических групп и культур. Несмотря на то что половых различий нет в детском возрасте, в возрасте 50–60 лет ФМ встречается в семь раз чаще у женщин [136, 137].

Хотя этиология ФМ по-прежнему не ясна, было выявлено нарушение процессинга боли, зависящего от нейроэндокринных, нейротрансмиттерных и нейросенсорных нарушений. Эти аномалии встречаются чаще у генетически предрасположенных людей [138, 139].

Патогенез этого заболевания остается неясным, и на данный момент нет ни одного метода обследования, подтверждающего ФМ. Ранние исследования патогенеза ФМ были сконцентрированы на возможной роли мышц и соединительной ткани. Однако никаких изменений в мышцах выявить не удалось.

ФМ не считается аутоиммунным заболеванием, хотя часто сочетается с другими аутоиммунными заболеваниями. Одним из таких заболеваний является целиакия [140]. Коморбидная триада из синдрома раздраженного кишечника (СРК), синдрома хронической усталости и мышечно-скелетной боли встречается достаточно часто. Известно, что перед тем как появиться болевому синдрому ФМ, у многих больных имеются жалобы на боль в животе, запоры, понос [141, 142].

Целиакия в семь раз чаще встречается при СРК по сравнению с общей популяцией [143]. Тестирование больных с СРК на целиакию считается рентабельным и рекомендовано в зарубежной клинической практике [144, 145, 146]. Л. Родриго в 2013 году было проведено обследование на целиакию 104 пациентов с СРК и ФМ и выяв-

лено 6,7% больных целиакией [147]. В то же время в недавнем исследовании Ф. Товоли обследовал 90 пациентов с ФМ на целиакию и выявил только 1% больных целиакией, как и в общей популяции [148, 149]. Известно, что от 20 до 32% больных СРК имеют ФМ и наоборот, от 32 до 70% больных ФМ страдают СРК [143].

Имеется несколько работ на небольшом количестве пациентов, доказывающих, что полиневропатия тонких волокон коррелирует с возникновением фибромиалгии [150, 151, 152, 153, 154]. Это объясняет тот факт, что боль при фибромиалгии считается невропатической и снимается антиконвульсантами, то есть так же, как и при болезненной полиневропатии [155, 156, 157, 158, 159].

Заключение

По многочисленным исследованиям видно, что у пациентов с целиакией имеются несколько синдромов, поражающих как центральную, так и периферическую нервную систему. Также целиакия является причиной распространенных болевых синдромов. Необходимо в практике невролога выделять глютенные неврологические синдромы, так как они могут быть курабельными. На данный момент имеется возможность своевременной диагностики целиакии. Соблюдение строгой пожизненной аглютенной диеты может значительно улучшить состояние пациентов с целиакией.

Список литературы

1. Lebowitz B, Rubio-Tapia A. Epidemiology, Presentation, and Diagnosis of Celiac Disease. *Gastroenterology*. 2020 Sep 17; 5:0016–5085 (20) 35165–9. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.06.098.
2. Lebowitz B, Sanders D.S. Coeliac disease. *Green Lancet*. 2018; 391: 70–81. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)31796-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31796-8)
3. Hugh J. Freeman. Celiac disease: a disorder from antiquity, its evolving classification and risk, and potential new treatment. *Gut Liver*. 2015; 9: 28–37. <http://dx.doi.org/10.5009/gnl14288>
4. Murray J.A., Frey M.R., Oliva-Hemker M. Celiac Disease. *Gastroenterology*. 2018. <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2017.12.026>
5. Парфенов А.И., Маев И.В., Баранов А.А., Бакулин И.Г., Сабельникова Е.А., Крумс Л.М., Бельмер С.В., Боровик Т.Э., Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А., Рославцева Е.А., Корниенко Е.А., Хавкин А.И., Потапов А.С., Ревнова М.О., Мухина Ю.Г., Щербаков П.Л., Федоров Е.Д., Белоусова Е.А., Хаиф И.А., Хомерики С.Г., Ротин Д.А., Воробьева Н.Г., Ливник А.В., Гудкова Р.Б., Быкова С.В., Чернин В.В., Волягина Н.В., Пушкарева Т.В., Дегтярев Д.А., Дамулин И.В., Мкртумян А.М., Джумай Г.С., Тетруашвили Н.К., Барановский А.Ю., Назаренко Л.И., Харитонов А.Г., Лоранская И.А., Яковенко Э.П., Сайфутдинов Р.Г., Ливзан М.А., Абрамов Д.А., Осипенко М.Ф., Орешко Л.С., Ткаченко Е.И., Ситкин С.И., Ефремов Л.И. Всероссийский консенсус по диагностике и лечению целиакии у детей и взрослых. Клинические рекомендации. <http://dx.doi.org/10.17116/arkh201789394-107>.
6. Gasbarrini G.B., Mangiola F. Wheat-related disorders: A broad spectrum of "evolving" diseases. *United European Gastroenterol. J.* 2014; 2 (4): 254–262. <http://dx.doi.org/10.1177/2050640614535929>

7. Lionetti E, Gatti S, Pulvirenti A, Catassi C. Celiac disease from a global perspective. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*. 2015; 29: 365–379. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpg.2015.05.004>
8. Rodríguez-Martín L, Vaquero L, Vivas S. New celiac disease biomarkers. *Rev. Esp. Enferm. Dig.* 2020 Oct; 112(10): 792–796. DOI: 10.17235/reed.2020.7217/2020. *Верхневолжский медицинский журнал*. 2013, № 11 (2). С. 42–48.
9. Castillo N.E., Theethira T. G., Leffler D.A. The present and the future in the diagnosis and management of celiac disease. *Gastroenterology Report*. 2015; 3 (1): 3–11. <http://dx.doi.org/10.1093/gastro/gou065>
10. Dieli-Crimi R., Carm C. M. The genetics of celiac disease: A comprehensive review of clinical implications. *Journal of Autoimmunity*. 2015: 1–16. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaut.2015.07.003>
11. Losurdo G., Principi M., Iannone A., Amoroso A., Ierardi E., Leo A. D., Barone M. Extra-intestinal manifestations of non-celiac gluten sensitivity: an expanding paradigm. *World J. Gastroenterol*. 2018; 24 (14): 1521–1530. <http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v24.i14.1521>
12. Malamut G., Cellier C. Complications of coeliac disease. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*. 2015; 29: 451–458. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpg.2015.05.005>
13. Hadjivassiliou M., Duker A. P., Sanders D. S. Gluten-related neurologic dysfunction. *Handb. Clin. Neurol.* 2014; 120: 607–619. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-7020-4087-0.00041-3>
14. Leffler D. A., Green P. H., Fasano A. Extraintestinal manifestations of celiac disease. *Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.* 2015; 12 (10): 561–571. <http://dx.doi.org/10.1038/nrgastro.2015.131>
15. Ehsani-Ardakani M. J., Rostami-Nejad M., Villanacci V., Volta U., Manenti S., Caio G., Giovenali P., Becheanu G., Diculescu M., Pellegrino S., Magazzù G., Casella G., Di Bella C., Decarli N., Biancalani M., Bassotti G., Hogg-Kollars S., Zail M. R., Rostami K. Gastrointestinal and non-gastrointestinal presentation in patients with celiac disease. *Arch. Iran. Med.* 2013; 16 (2): 78–82. <http://dx.doi.org/10.3162/AIM.006>
16. Luostarinen L., Pirttilä T., Collin P. Coeliac disease presenting with neurological disorders. *Eur. Neurol.* 1999; 42 (3): 132–135. <http://dx.doi.org/10.1159/000080806>
17. Nunes G., Barosa R., Patila M., Fernandes V., Gonçalves D., Fonseca J. World J. Adult Celiac Disease: The Importance of Extraintestinal Manifestations. *Gastroenterol.* 2017; 24: 292–295. <http://dx.doi.org/10.1159/000461593>
18. Aksoy E., Tiras-Teber S., Kansu A., Deda G., Kartal A. Neurological findings spectrum in Celiac disease. *The Turkish Journal of Pediatrics*. 2016; 58: 233–240. DOI: 10.24953/turkped.2016.03.001.
19. Anderson B., Pitsinger A. Improvement in Chronic Muscle Fasciculations With Dietary Change: A Suspected Case of Gluten Neuropathy. *Journal of Chiropractic Medicine*. 2014; 13: 188–191. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcm.2014.01.002>
20. Collaghan B. C., Price R. S., Feldman E. L. Distal symmetric polyneuropathy: a review. *JAMA*. 2015; 314: 2172–2181. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2015.13611>
21. Reda H., Chin-Semin R. L. Peripheral neuropathies of rheumatologic disease and gluten-related disorders. *Neuroal.* 2014; 34: 413–424. <http://dx.doi.org/10.1055/S-0034-1390390>
22. Tarabzouni S., Alkhalallah T. Isolated neurological manifestation in silent celiac disease. *J. Mov. Disord.* 2017; 10 (2): 105–107. <http://dx.doi.org/10.14802/jmd.16063>
23. Barbato M., Curione M., Amato S., et al. Autonomic imbalance in celiac children. *Minerva. Pediatr.* 2010; 62 (4): 333–338.
24. Kaplan J. G., Pack D., Horoupian D., DeSouza T., Brin M., Schaumburg H. Distal axonopathy associated with chronic gluten enteropathy: a treatable disorder. *Neurology*. 1988; 38 (4): 642–645. DOI: 10.1212/wnl.38.4.642.
25. Brannagan T. H. 3rd, Hays A. P., Chin S. S., Sander H. W., Chin R. L., Magda P., et al. Small-fiber neuropathy/neuropathy associated with celiac disease: skin biopsy findings. *Arch. Neurol.* 2005; 62: 1574–1578. <http://dx.doi.org/10.1001/archneur.62.10.1574>
26. Gibbons C. H., Freeman R. Autonomic neuropathy and coeliac disease. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*. 2005; 76 (4): 579–581. <http://dx.doi.org/10.1136/jnnp.2004.047480>
27. Lang M., Treister R., Oaklander A. L. Diagnostic value of blood tests for occult causes of initially idiopathic small-fiber polyneuropathy. *J. Neurol.* 2016; 263 (12): 2515–2527. <https://doi.org/10.1007/s00415-016-8270-5>
28. Farhad K., Traub R., Ruzhansky K. M., Brannagan T. H. 3rd. Causes of neuropathy in patients referred as idiopathic neuropathy. *Muscle Nerve*. 2016; 53 (6): 856–861. <http://dx.doi.org/10.1002/mus.24969>
29. Burk K., Farecki M. L., Lamprecht G., et al. Neurological symptoms in patients with biopsy proven celiac disease. *Mov Disord* 2009; 24 (16): 2358–2362. DOI: 10.1002/mds.22821.
30. Oaklander A. L. Immunotherapy prospects for painful small-fiber sensory neuropathies and ganglionopathies. *Neurotherapeutics*. 2016; 13 (1): 108–117. <http://dx.doi.org/10.1007/s13311-015-0395-1>
31. Oaklander A. L., Herzog Z. D., Downs H. M., Klein M. M. Objective evidence that small-fiber polyneuropathy underlies some illnesses currently labeled as fibromyalgia. *Pain*. 2013; 154 (11): 2310–2316. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2013.06.001>
32. Oaklander A. L. What is the meaning of 'small-fiber polyneuropathy' in fibromyalgia? An alternate answer. *Pain*. 2016; 157 (6): 1366–1367. <http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000526>
33. Tursi A, Giorgetti GM, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, et al. Peripheral neurological disturbances, autonomic dysfunction, and antineuronal antibodies in adult celiac disease before and after a gluten-free diet. *Dig. Dis. Sci.* 2006; 51: 1869–1874. DOI: 10.1007/s10620-005-9054-4.
34. Elfstrom P., Sundstrom J., Ludvigsson J. F. Systematic review with meta-analysis: associations between coeliac disease and type 1 diabetes. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2014; 40: 1123–1132. <http://dx.doi.org/10.1111/apt.12973>
35. Thawani S., Brannagan T. H., Lebowhl B., Mollazadegan K., Green P. H., Ludvigsson J. F. Type 1 diabetes, celiac disease, and neuropathy – a nationwide cohort study. *J. Clin. Neurosci.* 2017; 19: 12–18. DOI: 10.1097/CND.0000000000000174.
36. Dennis M., Lee A. R., McCarthy T. Nutritional Considerations of the Gluten-Free Diet. *Gastroenterol. Clin. North. Am.* 2019 Mar; 48 (1): 53–72. DOI: 10.1016/j.gtc.2018.09.002.
37. Anandacoomaraswamy D., Ullal J., Vinik A. L. A 70-year-old male with peripheral neuropathy, ataxia and anti-gliadin antibodies shows improvement in neuropathy, but not ataxia, after intravenous immunoglobulin and gluten-free diet. *J. Multidiscip. Healthc.* 2008; 1: 93–96. DOI: 10.2147/jmhd.s3018.
38. Luostarinen L., Himanen S. L., Luostarinen M., Collin P., Pirttilä T. Neuromuscular and sensory disturbances in patients with well treated coeliac disease. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*. 2003; 74 (4): 490–494. DOI: 10.1136/jnnp.74.4.490.
39. Caio G., De Giorgio R., Venturi A., Giancola F., Latorre R., Boschetti E. Clinical and immunological relevance of anti-neuronal antibodies in celiac disease with neurological manifestations. *Gastroenterol. Hepatol. Bed. Bench.* 2015; 8 (2): 146–152.
40. Estévez V., Ayala J., Vespa C., Araya M. The gluten-free basic food basket: a problem of availability, cost and nutritional composition. *Eur. J. Clin. Nutr.* 2016; 70 (10): 1215–1217. <http://dx.doi.org/10.1038/ejcn.2016.139>
41. Hadjivassiliou M., Kandlar R. H., Chaffapadhyay A. K., et al. Dietary treatment of gluten neuropathy. *Muscle Nerve*. 2006; 34 (6): 762–766. <http://dx.doi.org/10.1002/mus.20642>
42. Briani C., Riggero S., Zara G., et al. Anti-ganglioside antibodies in children with celiac disease: correlation with gluten-free diet and neurological complications. *Aliment Pharmacol. Ther.* 2004; 20: 231–235. DOI: 10.1196/annals.1361.056.
43. Volta U., Caio G., Giancola F., Rhoden K. J., Ruggeri E., Boschetti E., Stanghellini V., De Giorgio R. Features and progression of peripheral celiac disease in adults. *Clin. Gastroenterol. Hepatol.* 2016; 14 (5): 686–693. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cgh.2015.10.024>
44. Freeman H. J. Dietary compliance in celiac disease. *World J. Gastroenterol.* 2017; 23 (15): 2635–2639. <http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v23.i15.2635>
45. Kaur Bilkhoo H., Ducruet T., Marchand V., Deslandres C., Djemli A., Dal Soglio D., Patey N. Revisiting pathological criteria for earlier diagnosis of celiac disease. *J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.* 2016; 62 (5): 734–738. <http://dx.doi.org/10.1097/MPG.0000000000001026>
46. Garnier-Englin H., Cerf-Bennussan N., Ruetmele F. M. Celiac disease in children. *Clin. Res. Hepatol. Gastroenterol.* 2015; 39: 544–551. <http://dx.doi.org/10.3390/jrph14070785>
47. Sel C. G., Aksoy E., Aksay A., Yüksel D., Özbay F. Neurological manifestations of atypical celiac disease in childhood. *Acta. Neurol. Belg.* 2017; 117 (3): 719–727. <http://dx.doi.org/10.1007/s13760-017-0781-z>
48. Shapiro M., Blanco D. A. The neurological manifestations of gastrointestinal disease. *Seminars in Pediatric Neurology*. 2017; 24 (1): 43–53. <http://dx.doi.org/10.1016/j.spen.2017.02.001>
49. Boskovic A., Stankovic I. Axonal and demyelinating polyneuropathy associated with celiac disease. *Indian pediatr.* 2014; 51 (4): 311–312. DOI: 10.1007/s13312-014-0385-0.
50. Santos M. O., Ohana B., de Carvalho M. Celiac disease and a novel association with a multifocal acquired motor axonopathy (MAMA). *Clinical Neurophysiology*. 2017; 128 (9): 1596–1598. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2017.06.038>
51. Gupta V., Kohli A. Celiac disease associated with recurrent Guillain Barre Syndrome. *Indian Pediatr.* 2010; 47: 797–798. DOI: 10.1007/s13312-010-0105-3.
52. Pacitto A., Paglino A., Di Genova L., Leonardi A., Farinelli E., Principi N., di Cara G., Esposito S. Celiac disease presenting with peripheral neuropathy in children: a case report. *J. Environ. Res. Public Health* 2017; 14: 785. <http://dx.doi.org/10.3390/jrph14070785>
53. Kelly C. P., Bai J. C., Liu E., Leffler D. A. Advances in diagnosis and management of celiac disease. *Gastroenterology*. 2015; 148 (6): 1175–1186. <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2015.01.044>
54. Keon A., Lennon V. A., Pittcock S. J., Kryzer T. J., Murray J. The neurologic significance of celiac disease biomarkers. *Neurology* 2014; 83 (20): 1789–1795. <http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000000970>
55. Klöck C., DiRaimondo T. R., Khosla C. Role of Transglutaminase 2 in Celiac Disease Pathogenesis. *Semin. Immunopathol.* 2012. N. 34. P. 513–522. DOI: 10.1007/s00281-012-0305-0.
56. Meresse B., Malamut G., Cerf-Bennussan N. Celiac Disease: an immunological jigsaw. *Immunology* 2012; 29: 907–9119. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2012.06.006>
57. Szondy Z., Korponay-Szabó I., Király R., Sarang Z., Tsay G. J. Transglutaminase 2 in human diseases. *Bio Medicine*. 2017; 7 (3): 1–13. <http://dx.doi.org/10.1051/bmdcn/2017070315>
58. Bañfl B., Vincent A., Meink H. M., Irani S. R., Bhatia K. P. Movement disorders with neuronal antibodies: syndromic approach, genetic parallels and pathophysiology. *Brain*. 2018; 141 (1): 13–36. <http://dx.doi.org/10.1093/brain/awx189>
59. Lyftton S., Antiga E., Pfeiffer S., Matthias T., Poplawska A. S., Ulaganathan K., et al. Neo-epitope tissue transglutaminase autoantibodies as a biomarker of the glutensensitive skin disease – Dermatitis herpetiformis. *Clin. Chim. Acta.* 2013; 415: 346–9. DOI: 10.1016/j.cca.2012.10.051.
60. Lerner A., Makhoul B., Eliakim R. Neurological manifestations of celiac disease in children, adults. *Eur Neurol J.* 2010; 000: 1–6. DOI: 10.1542/peeds.113.6.1672.
61. Kochhar G. S., Singh T., Gill A., Kirby D. F. Celiac disease: managing a multisystem disorder. *Cleve Clin. J. Med.* 2016; 83 (3): 217–227. <http://dx.doi.org/10.3949/ccjm.83a.14158>
62. McKeon A., Lennon VA, Pittcock SJ, Kryzer TJ, Murray J. The neurologic significance of celiac disease biomarkers. *Neurology*. 2014; 83 (20): 1789–1796. DOI: 10.1212/WNL.0000000000000970.
63. Avila D., Lacomis D. Proximal limb weakness in a patient with celiac disease: copper deficiency, gluten sensitivity, or both as the underlying cause? *Neurological Medicine*. 2016; Article ID 5415949, 4 pages. <http://dx.doi.org/10.1155/2016/5415949>
64. Patterson SK, Green PH, Tennyson CA, Lewis SK, Brannagan TH III. Copper levels in patients with celiac neuropathy. *J. Clin. Neurosci.* 2012; 14 (11): 11–16. DOI: 10.1097/CND.0b013e318260b455.
65. Chin R. L., Sander H. W., Brannagan T. H., Green P. H., Hays A. P., Alaeidini A., et al. Celiac neuropathy. *Neurology*. 2003; 60: 1581–1585. DOI: 10.1212/01.wnl.0000063307.84039.c7.
66. Sander H. W., Magda P., Chin R. L., et al. Cerebellar ataxia and coeliac disease. *Lancet*. 2003; 362 (9395): 1548. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)14743-5.
67. Roshlak S., Snyder M. R., Pittcock J., Wu T.-T., Gandhi M. J., Murray J. A. Serology of celiac disease in gluten-sensitive ataxia or neuropathy: role of deamidated gliadin antibody. *J. Neuroimmunol.* 2011; 230 (1–2): 130–134. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2010.09.024>
68. Przybylska-Felus M., Furgala A., Zwolinska-Wcislo M., Mazur M., Widera A., Thor P., Mach T. Disturbances of autonomic nervous system activity and diminished response to stress in patients with celiac disease. *J. Physiol. Pharmacol.* 2014; 65 (6): 833–41.
69. Usai P., Usai Satta P., Savarino V., Boy M. F. Autonomic neuropathy in adult celiac disease. *Am. J. Gastroenterol.* 1996; 91 (8): 1676–1677.
70. Anil S., Bhavsar, Verma S., Lamba R., Chandana G. Lall, Koenigsnecht V., Rajesh A. Abdominal manifestations of neurologic disorders. *Radio Graphics*. 2013; 33: 135–153. <https://doi.org/10.1148/rg.331125097>
71. Pinto-Sánchez M. I., Berck P., Verdu E. F., Bai J. C. Extraintestinal Manifestations of Celiac Disease. *Dig. Dis.* 2015; 33: 147–154. <http://dx.doi.org/10.1159/000369541>
72. Ryzewska G. Markers of autonomic nervous system impairment in celiac disease: we know the questions to ask but we still do not have answers. *Pol. Arch. Med. Wewn.* 2016; 126 (11): 842–844. <http://dx.doi.org/10.20452/pamw.3697>
73. Valent S., Corica D., Ricciardi L., Romano C. Gluten-related disorders: certainties, questions and doubts. *Annals of Medicine*. 2017. <http://dx.doi.org/10.1080/07853890.2017.1325968>
74. Bai J. C., Fried M., Corazza G. R., Schuppman D., Farthing M., Catassi C., Greco L., Cohen H., Ciacci C., Eliakim R., Fasano A., Gonzalez A., Krabshuis J. H., LeMaire A. World gastroenterology organisation global guidelines on celiac disease. *J. Clin. Gastroenterol.* 2013; 47 (2): 121–126. <http://dx.doi.org/10.1097/MCG.0b013e31827a6f83>
75. Mennini M., Baglivo I., Ferrari F. Neuropathy and celiac disease—when a gluten-free diet is not enough. *Neurology*. 2015; 72 (10): 1208–1209. <http://dx.doi.org/10.1001/jamaneuro.2015.2069>
76. Maiya RP, Messing RO. Peripheral systems: neuropathy. *Handb Clin Neurol.* 2014; 125: 513–525. DOI: 10.1016/B978-0-444-62619-6.00029-X.
77. Shen T. C., Lebowhl B., Verma H., et al. Peripheral neuropathic symptoms in celiac disease and inflammatory bowel disease. *J. Clin. NeuroMuscul. Dis.* 2012; 13 (3): 137–145. DOI: 10.1097/CND.0b013e31821c55a1.
78. Ludvigsson J. F., Olsson T., Ekborn A., Montgomery S. M. A population-based study of coeliac disease, neurodegenerative and neuroinflammatory diseases. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2007; 25 (11): 1317–1327. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2007.03329.x>
79. Thawani S., Brannagan T. H., Lebowhl B., Green P. H., Ludvigsson J. F. Risk of neuropathy among 28232 patients with biopsy-verified celiac disease. *Pediatric Neurology Briefs*. 2015; 29 (7): 55. <http://dx.doi.org/10.15844/ped-neurobriefs-29-7-6>
80. Chin R. L., Tseng V. G., Green P. H., Sander H. W., Brannagan T. H. III, Latov N. Multifocal axonal polyneuropathy in celiac disease. *Neurology*. 2006; 66 (12): 1923–1925. <http://dx.doi.org/10.1212/01.wnl.0000208413.40583.6c>
81. Cicarelli G., Della Rocca G., Amboni M., et al. Clinical and neurological abnormalities in adult celiac disease. *Neurol. Sci.* 2003; 24 (5): 311–317. <http://dx.doi.org/10.1007/s10072-003-0181-4>
82. Green P. H., Krishnareddy S., Lebowhl B. Clinical manifestations of celiac disease. *Dig. Dis.* 2015; 33 (2): 137–140. <http://dx.doi.org/10.1159/000370204>
83. Stowe R. C., Karkare S., Puri V. Case report of subacute cerebellar ataxia of adolescence with long-term sequelae. *J. Child Neurol.* 2012. N. 28 (12). P. 1653–1660. DOI: 10.1177/0883073812460583.
84. Kowalczyk M. U., Śmigielski J., Gmitrowicz A. Neuropsychiatric symptoms and celiac disease. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2014; 10: 1961–1964. <http://dx.doi.org/10.2147/NDT.S69039>

85. Campagna G., Pesce M., Tatangelo R., Rizzuto A., La Fratall, Grilli A. The progression of celiac disease: its neurological and psychiatric implications. *Nutrition Research Reviews*. 2017; 30 (1): 25–35. <http://dx.doi.org/10.1017/S0954422416000214>
86. Casella G., Bordo B.M., Schalling R., Villanacci V., Salemm M., Di Bella C., Baldini V., Bassotti G. Neurological disorders and celiac disease. *Minerva Gastroenterol. Dietol.* 2016; 62 (2): 197–206.
87. Kang J.Y., Kang A.H., Green A., Gwee K.A. Systematic review: worldwide variation in the frequency of celiac disease and changes over time. *Aliment Pharmacol Ther.* 2013. № 38. P. 26–45. DOI: 10.1111/apt.12373.
88. Hadjivassiliou M., Wallis L.L., Hoggard N., Grünewald R.A. MR spectroscopy and atrophy in Gluten, Friedreich's and SCA6 ataxias. *Acta Neurol. Scand.* 2011. № 126 (2). P. 138–143. DOI: 10.1016/j.neuro.2012.08.003.
89. Lock R.J., Tengah P., Unsworth D.J., Ward J.J. Ataxia, peripheral neuropathy, and anti-gliadin antibody. *Guilt by association?* *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry.* 2005. № 76. P. 1601–1603. DOI: 10.1136/jnnp.2004.058487.
90. Jarius S., Wildemann B. 'Medusa head ataxia': the expanding spectrum of Purkinje cell antibodies in autoimmune cerebellar ataxia. Part 1: Anti-mGluR1, anti-Homer-3, anti-Sj/ITPR1 and anti-CARP VIII. *Journal of Neuroinflammation.* 2015; 12: 166. <https://doi.org/10.1186/s12974-015-0356-y>
91. Zis P., Sarigianni P.G., Rao D.G., Hoggard N., Sanders D.S., Hadjivassiliou M. Cerebellar ataxia with sensory ganglionopathy: does autoimmunity have a role to play. *Cerebellum & Ataxias.* 2017; 4: 20. <http://doi.org/10.1186/s40673-017-0079-1>
92. Combarros Q., Infante J., Lopez-Hoyos M., Bartolome M.J. Celiac disease and idiopathic cerebellar ataxia. *American Academy of Neurology.* 2000. № 13. P. 2346–2352. DOI: 10.1212/wnl.54.12.2346.
93. Hernandez L., Green P.H. Extraintestinal manifestations of celiac disease. *Curr. Gastroenterol. Rep.* 2006; 8 (5): 383–389. DOI: 10.1007/s11894-006-0023-7.
94. Nanri K., Makoto S., Takeshi T., Akira H. Selective loss of Purkinje cells in a patient with anti-gliadin-antibody-positive autoimmune cerebellar ataxia. *Diagn. Pathol.* 2011. № 6. P. 14–19. DOI: 10.1186/1746-1596-6-14.
95. Habek M., Hajsak I., Barun B., Brinar V.V. Downbeat nystagmus, ataxia and spastic tetraparesis due to celiac disease. *Neurol. Sci.* 2011; 32 (5): 911–914. DOI: 10.1007/s10072-011-0506-7.
96. Hadjivassiliou M., Sanders D.D., Aeschlimann D.P. Gluten-Related Disorders: Gluten Ataxia. *Dig Dis.* 2015; 33: 264–268. <http://doi.org/10.1159/000369509>
97. Hadjivassiliou M., Aeschlimann P., Sanders D.S., et al. Transglutaminase 6 antibodies in the diagnosis of gluten ataxia. *Neurology.* 2013; 80 (19): 1740–1745. <http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0b013e3182919070>
98. Hadjivassiliou M., Aeschlimann P., Strigun A., Sanders D.S., Woodroffe N., Aeschlimann D. Autoantibodies in gluten ataxia recognize a novel neuronal transglutaminase. *Ann. Neurol.* 2008; 64 (3): 332–343. <http://dx.doi.org/10.1002/ana.21450>
99. Lindfors K., Koskinen O., Laurila K., et al. IgA-class autoantibodies against neuronal transglutaminase, TG6 in celiac disease: no evidence for gluten dependency. *Acta Clin. Chim.* 2011. № 412 (13–14). P. 1187–1190. DOI: 10.1016/j.cca.2010.09.042.
100. Wilkinson I.D., Hadjivassiliou M., Dickson J.M., Wallis L. Cerebellar abnormalities on proton MR spectroscopy in gluten ataxia. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry.* 2005. № 76 (7). P. 1011–1013. DOI: 10.1136/jnnp.2004.049809.
101. Kumar J., Kumar M., Pandey R., Chauhan N.S. Pathophysiology and Management of Gluten-Induced Celiac Disease. *Journal of Food Science.* 2017; 82 (2): 270–277. <http://dx.doi.org/10.1111/1755-3217.13612>
102. Hadjivassiliou M., Rao D.G., Grünewald R.A., Aeschlimann D.P., Sarigianni P.G., Hoggard N., Aeschlimann P., Mooney P.D., Sanders D.S. Neurological dysfunction in celiac disease and non-celiac gluten sensitivity. *Am. J. Gastroenterol.* 2016; 111: 561–567. <http://dx.doi.org/10.1038/ajg.2015.434>
103. Lau M.S., Sanders D.S. Optimizing the diagnosis of celiac disease. *Curr. Opin. Gastroenterol.* 2017; 33 (3): 173–180. <http://dx.doi.org/10.1097/MOG.0000000000000343>
104. Pennisi M., Bramanti A., Cantone M., Pennisi G., Bella R., Lanza G. Neurophysiology of the "Celiac Brain": Disentangling Gut-Brain Connections. *Front Neurosci.* 2017; 11: 498. <http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2017.00498>
105. Currie S., Hadjivassiliou M., Clark M.J., et al. Alcohol Induces Sensitization to Gluten in Genetically Susceptible Individuals: A Case Control Study. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry.* 2012. № 83 (12). P. 1216–1221. DOI: 10.1136/jnnp.2011.027638.
106. Versino M., Franciotta D., Colnaghi S., et al. Cerebellar signs in celiac disease. *Neurology.* 2009. № 2 (23). P. 2046–2048. DOI: 10.1212/WNL.0b013e3181a92c12.
107. Крумс А. М., Парфенов А. И., Сабельникова Е. А., Гудкова П. Б., Воробьева Н. Н. Лечение и профилактика глютенчувствительной целиакии. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2011. № 2. С. 86–92.
108. Kaikinen K., Lindfors K., Mäki M. Advances in the treatment of celiac disease: an immunopathogenic perspective. *Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.* 2013. № 6. P. 38–41. DOI: 10.1038/nrgastro.2013.141.
109. Kurada S., Yadav A., Leffler D.A. Current and novel therapeutic strategies in celiac disease. *Expert Rev. Clin. Pharmacol.* 2016; 9 (9): 1211–1223. <http://dx.doi.org/10.1080/17512433.2016.1200463>
110. Mukherjee R., Kelly C.P., Schupp D. Nondietary therapies for celiac disease. *Gastrointest Endosc. Clin. N. Am.* 2012. № 22. P. 11–31. DOI: 10.1016/j.giec.2012.09.001.
111. Lahoz C.H., Saez L.R., Villar J.V., Capdevila G.M., Juanes J.M. Familial Gluten Ataxia. *Movement Disorders.* 2014; 29. P. 3. <http://dx.doi.org/10.1002/mds.25783>
112. Le Gal J., Michel J.F., Rinaldi V.E., Spiri D., Morelli R. Association between functional gastrointestinal disorders and migraine in children and adolescents: a case-control study. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology.* 2016; 1 (2): 114–121. [https://doi.org/10.1016/S2468-1253\(16\)30038-3](https://doi.org/10.1016/S2468-1253(16)30038-3)
113. Petrarca L., Nenna R. Headache and celiac disease: an increasingly investigated association. *American Headache Society.* 2016; 56 (9): 1520–1521. <http://dx.doi.org/10.1111/head.12958>
114. Zelnik N., Pacht A., Obeid R., Lerner A. Range of neurological disorders in patients with celiac disease. *Pediatrics* (2004) 113: 1672–6. DOI: 10.1542/peds.113.6.1672
115. Dimitrova A.K., Ungaro R.C., Lebowitz B., Lewis S.K., Tennyson C.A., Green M.W. Prevalence of migraine in patients with celiac disease and inflammatory bowel disease. *Headache.* 2013; 53: 344–55. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1526-4610.2012.02260.x>
116. Alehan F., Ozcay F., Erol I., Canan O., Cemil T. Increased risk for celiac disease in paediatric patients with migraine. *Cephalalgia.* 2008; 28: 945–949. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2982.2008.01630.x>
117. Lebowitz B., Roy A., Alaadini A., Green P.H.R. Risk of headache-related healthcare visits in patients with celiac disease: a population-based observational study. DOI: 10.1111/head.127842016.
118. Cámara-Lemarroy C.R., Rodriguez-Gutierrez R., Monreal-Robles R., Marfil-Rivera A. Gastrointestinal disorders associated with migraine: a comprehensive review. *World J. Gastroenterol.* 2016; 22 (36): 8149–8160. <http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v22.i36.8149>
119. Mormile R. Celiac disease and migraine: is there a common backstage? *J. Colorectal. Dis.* 2014; 29: 1571. <http://dx.doi.org/10.1007/s00384-014-1923-x>
120. Pfeiffer R.F. Gastroenterology and Neurology. *Continuum.* Continuum [Minneapolis, Minn.]. 2017 Jun; 23 (3, Neurology of Systemic Disease): 744–761. DOI: 10.1212/CON.0000000000000484.
121. Ciaccio E.J., Bhagat G., Lewis S.K., Green P.H. Quantitative image analysis of celiac disease. *World J. Gastroenterol.* 2015; 21 (9): 2577–2581. <http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v21.i9.2577>
122. Adolorato G., Di Giuda D., De Rossi G., Valenza V., Domenicali M., Caputo F., Gasbarrini A., Capristo E., Gasbarrini G. Regional cerebral hypoperfusion in patients with celiac disease. *Am J Med.* 2004 Mar; 116 (5): 312–7. DOI: 10.1016/j.amjmed.2003.09.037.
123. Hamel E. Serotonin and migraine: biology and clinical implications. *Cephalalgia.* 2007. Vol. 27, N11. P. 1293–1300. DOI: 10.1111/j.1468-2982.2007.01476.x.
124. Tavakkoli A., Green P.H. Probiotic therapy for celiac disease. *J. Clin. Gastroenterol.* 2013; 47 (2): 101–103. <http://dx.doi.org/10.1097/MCG.0b013e31827b507d>
125. Hindiyyeh N., Aurora S.K. What the gut can teach us about migraine. *Curr. Pain. Headache. Rep.* 2015; 19 (7): 33. <https://doi.org/10.1007/s11916-015-0501-4>
126. Rahmoune H., Boufird N. Migraine, celiac disease and intestinal microbiota. *Pediatr Neurol Briefs.* 2017 Feb; 31 (2): 6. DOI: 10.15844/pepneurbriefs-31-2-3.
127. Chen X., D'Souza R., Hong S.T. The role of gut microbiota in the gut brain axis: current challenges and perspectives. *Protein Cell.* 2013; 4: 403–414. <http://dx.doi.org/10.1007/s13238-013-3017-x>
128. Wang Y., Kasper LH. The role of microbiome in central nervous system disorders. *Brain Behav Immun.* (2014) 38. C: 1–12. DOI: 10.1016/j.bbi.2013.12.011.
129. Waszczuk E., Waszczuk K. Gluten, Dysbiosis, and Genetics in Celiac Disease: All Are Important. *Dig. Dis. Sci.* 2016; 61: 2761–2762. <http://dx.doi.org/10.1007/s10620-016-4264-5>
130. Verdu E.F., Galipeau H.J., Jabri B. Novel players in celiac disease pathogenesis: role of the gut microbiota. *Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.* 2015; 12 (9): 497–506. <http://dx.doi.org/10.1038/nrgastro.2015.90>
131. Sanders ME, Guamer F, Guerrant R, Hoff PR, Quigley EM, Sartor RB, et al. An update on the use and investigation of probiotics in health and disease. *Gut* (2013) 62: 787–96. DOI: 10.1136/gutjnl-2012-302504.
132. Collins S.M., Surette M., Bercik P. The interplay between the intestinal microbiota and the brain. *Nat. Rev. Microbiol.* 2012; 10: 735–742. <http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2876>
133. Sensenig J., Johnson M., Staversky T. Treatment of migraine with targeted nutrition focused on improved assimilation and elimination. *Altern Med Rev* (2001) 6: 488–94.
134. Mulder C.J., Wierdsma N.J., Berkenpas M., Jacobs J.M., Voorna G. Preventing complications in celiac disease: our experience with managing adult celiac disease. *Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab.* 2015; 29: 459–468. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpg.2015.05.006>
135. Табеева Т.Г. Фирмолиалгия: формирование симптомов и принципы терапии. *Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика.* 2012. № 1. P. 23–27.
136. Bennett R., Friend R., Marcus D., et al. Criteria for the diagnosis of fibromyalgia: validation of the modified 2010 preliminary ACR criteria and the development of alternative criteria. *Arthritis Care. Res. (Hoboken)* 2014; epub ahead of print. <http://dx.doi.org/10.1002/acr.22301>
137. Cristoforo F., Fontana C., Magistà A., Capriati T., Indrio F., Castellanello S., et al. Increased prevalence of celiac disease among pediatric patients with irritable bowel syndrome: a 6-year prospective cohort study. *JAMA Pediatr.* 2014; 168 (6): 555–60. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.4984>
138. Smith H.S., Harris R., Clauw D. Fibromyalgia: an afferent processing disorder leading to a complex pain generalized syndrome. *Pain Physician.* 2011. № 14. P. 217–245.
139. Sarzi-Puttini P., Atzeni F., Di Franco M., Buskilla D., Alciati A., Giacomelli C., Rossi A., Bazzichi L. Dysfunctional syndromes and fibromyalgia: a 2012 critical digest. *Clin. Exp. Rheumatol.* 2012. № 30. P. 143–151.
140. Rani U., Imdad A., Beg M. Rare neurological manifestation of celiac disease. *Case Rep. Gastroenterol.* 2015; 9: 200–205. <http://dx.doi.org/10.1159/000431170>
141. Garcia-Leiva J.M., Carrasco J.L., Slim M., Colandre E.P. Celiac symptoms in patients with fibromyalgia: a cross-sectional study. *Rheumatol Int.* 2015; 35 (3): 561–567. <http://dx.doi.org/10.1007/s00296-014-3110-3>
142. Yunus M.B. The prevalence of fibromyalgia in other chronic pain conditions. *Pain Res. Treat.* 2012. № 12. P. 584–573. DOI: 10.1155/2012/584573.
143. Sainsbury A., Sanders D.S., Ford A.C. Prevalence of irritable bowel syndrome-type symptoms in patients with celiac disease: a meta-analysis. *Clin. Gastroenterol. Hepatol.* 2013. № 11. P. 359–365. DOI: 10.1016/j.cgh.2012.11.033.
144. Isaci C., Colmenero L., Casco F., Tejerina E., Fernandez N., Serrano-Vela J.L., Castro M.J., Villa L.F. Fibromyalgia and nonceliac gluten sensitivity: a description with remission of fibromyalgia. *Rheumatol Int.* 2014; 34: 1607–1612. <http://dx.doi.org/10.1007/s00296-014-2990-6>
145. Slim M., Colandre E.P., Villadomros F.R. An insight into the gastrointestinal component of fibromyalgia: clinical manifestations and potential underlying mechanisms. *Rheumatol Int.* 2015; 35: 433–444. <http://dx.doi.org/10.1007/s00296-014-3109-9>
146. Zwolinska-Wcislo M., Galicka-Latala D., Rozpondek P., Rudnicka-Sosin L., et al. Frequency of celiac disease and irritable bowel syndrome coexistence and its influence on the disease course. *Przegl. Lek.* 2009. № 66. P. 126–129.
147. Rodrigo L., Blanco I., Bobes J., de Serres F.J. Remarkable prevalence of celiac disease in patients with irritable bowel syndrome plus fibromyalgia in comparison with those with isolated irritable bowel syndrome: a case-finding study. *Arthritis Res. Therapy.* 2013. № 15. P. 1–12. DOI: 10.1186/ar4391.
148. Tovoli F., Masi C., Guidetti E., Negrini G., Paterini P., Bolondi L. Clinical and diagnostic aspects of gluten related disorders. *World J. Clin. Cases.* 2015; 3 (3): 275–284. <http://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v3.i3.275>
149. Tovoli F., Giampaolo L., Caio G., Monti M., et al. Fibromyalgia and celiac disease: a media hype or an emerging clinical problem? *Clin. Exp. Rheumatol.* 2013. № 31. P. 50–52.
150. Giannoccolo M.P., Donadio V., Incensi A., Avoni P., Li-guori R. Small nerve fiber involvement in patients referred for fibromyalgia. *Muscle. Nerve.* 2014; 49 (5): 757–759. <http://dx.doi.org/10.1002/mus.24156>
151. Lodahl M., Treister R., Ocklander A.L. Specific symptoms may discriminate between fibromyalgia patients with vs without objective test evidence of small-fiber polyneuropathy. *Pain Rep.* 2017; 3 (1): 633. DOI: 10.1097/PR9.0000000000000633.
152. Nishihara R., Marques A.P., Mei A., Skare T. Celiac disease and fibromyalgia: is there an association? *Rev. Esp. Enferm. Dig.* 2016; 108 (2): 107–108. <http://dx.doi.org/10.17235/reed.2015.3992/2015>
153. Qaeyler N., Sommer C. Objective evidence that small-fiber polyneuropathy underlies some illnesses currently labeled as fibromyalgia. *Pain* 2013; 154 (11): 2569. DOI: 10.1016/j.pain.2013.06.037.
154. Qaeyler N., Zeller D., Kahn A.K., et al. Small fibre pathology in patients with fibromyalgia syndrome. *Brain.* 2013; 136 (6): 1857–1867. <http://dx.doi.org/10.1093/brain/awf053>
155. Gill D., Derry S., Wiffen P.J., Moore R.A. Valproic acid and sodium valproate for neuropathic pain and fibromyalgia in adults. *Cochrane Database. Syst. Rev.* 2011; (10): 83–91. DOI: 10.1002/14651858.CD009183.pub2.
156. Hearn L., Derry S., Moore R.A. Lacosamide for neuropathic pain and fibromyalgia in adults. *Cochrane Database. Syst. Rev.* 2012; 15(2): CD009318. <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD009318.pub2>
157. Moore R.A., Wiffen P.J., Derry S., McQuay H.J. Gabapentin for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; (3): CD007938. DOI: 10.1002/14651858.CD007938.pub4.
158. Moore R.A., Derry S., Aldington D., Cole P., Wiffen P.J. Amitriptyline for neuropathic pain and fibromyalgia in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2012; 12: CD008242. DOI: 10.1002/14651858.CD008242.pub3.
159. Wright A., Luedtke K.E., Vandenberg C. Duloxetine in the treatment of chronic pain due to fibromyalgia and diabetic neuropathy. *J. Pain Res.* 2011; 4: 1–10. <http://dx.doi.org/10.2147/JPR.S12866>